

INSECTICIDA

TERÁPICO PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

GRUPO 4

philimida 60

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

COMPOSICION:

imidacloprid: 1-6(cloro-3-piridinil-metil)-N-nitro-imidazolidin-2-ilideneamina 60 g
inertes, coadyuvantes y colorantes.... c.s.p. 100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA Nº: **35.842**

Número de partida:

Fecha de vencimiento:

INDUSTRIA ARGENTINA

Contenido Neto: **1 Lt**

NO INFLAMABLE

PRECAUCIONES:

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA**

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Evite su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Usar guantes de goma, careta, y antiparras durante la aplicación. No beber, comer o fumar durante los tratamientos. Finalizados los mismos, lavarse prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto.

RIESGOS AMBIENTALES:

ABEJAS: Toxicidad para abejas: producto altamente tóxico para abejas. Por el tipo de producto, Terápico para tratamiento de semillas, no se espera exposición.

AVES: Producto moderadamente tóxico para aves: No debe dejarse semilla tratada al alcance de las aves. Alejar y poner a resguardo de la aplicación a aves domésticas.

PECES: Prácticamente no tóxico para peces y otros organismos acuáticos.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en un depósito, en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. El remanente del tanque aplicador, deberá ser eliminado en

Registrado:



PHILAGRO S. A.

Bernardo de Irigoyen 722, Piso 11, Of. "A" (C1072AAP) Capital Federal
TEL/FAX: (011) 4342-4330 / 4342-5370

lugares que no afecte la biodiversidad ambiental. Aplicar en caminos de tierra, alambrados, etc.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: Verificar que estén vacíos. NO QUEMAR A CIELO ABIERTO. Guardar en un contenedor hasta ser llevados a una planta de tratamiento para su destrucción

ALMACENAMIENTO: Conservar en su envase original, herméticamente cerrado, en lugares sombreados, frescos y secos, lejos de alimentos y forrajes.

DERRAMES: Cubrir el área con tierra o arena y carbonato de sodio. Barrer y recoger el producto en un contenedor bien identificado para ser luego transportado a una planta de tratamiento, para su destrucción.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión accidental, dar de beber dos vasos de agua y llamar al médico. En caso de inhalación, poner al paciente al aire libre. En caso de contacto con la piel, lavar las partes afectadas con abundante agua limpia y jabón. Por salpicaduras en ojos, enjuagarlos durante 15 minutos con abundante agua limpia. **EN TODOS LOS CASOS PROCURAR ASISTENCIA MEDICA.**

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO. CLASE II. No posee antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. Grupo químico: Nitroguanidina

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Malestar general, fatiga, contracción, debilidad muscular, calambres.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION: • Centro Toxicológico del Hospital de Niños de Bs. As. Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: 4962-2247/6666.

• Hospital de Clínicas José de San Martín. Tel.: 5950-8804/06. • Centro de consultas toxicológicas TAS durante las 24 hs. Tel. (0341) 424-2727. • Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas (Haedo, Pcia Bs.As.) Tel.: 4654 - 6648 y 4658-7777. **Línea Gratuita 0800-333-0160**

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: PHILIMIDA 60 es un insecticida sistémico que actúa por ingestión y contacto y se usa como terapico para semillas para el control en forma temprana, desde el arranque, de numerosas plagas, que afectan al cultivo de cereales, algodón, papa y praderas. No altera el poder germinativo de la semilla.

INSTRUCCIONES DE USO: PREPARACION: Agitar el producto antes de usar. A las dosis indicadas de **PHILIMIDA 60** agregar 2 litros de agua cada 100 kg de semillas. Lograr una aplicación fluida y uniforme sobre la semilla.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACION: El equipo a utilizar debe estar diseñado para tal fin, en su defecto pueden utilizarse máquinas del tipo hormigoneras o tambores rotativos de eje excéntrico. La semilla que se destina al tratamiento debe ser previamente ventilada para eliminar restos de vegetales, polvo, etc y debe poseer buena energía y poder germinativo. Poner especial cuidado en la dosificación cuando se inicien los tratamientos. Evitar la subdosificación. La semilla puede tratarse con anticipación a la siembra.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	Plagas que controla		Dosis para 100 Kg de Semilla
	Específicas	Generales	
Soja	Picudo de la Soja (Promecops carinicolis)	-----	50-70 cm3
Girasol	Tenebriónido del girasol (Blapstinus spp.)	Insectos de Suelo: Gusanos blancos (Diloboderus abderus; Cyclocephala spp.) Gusanos alambre (Discyretus gagotes, Conoderus spp. Agriotes spp.)	500-600 cm3
Maíz	Vector de Mal de Río Cuarto (Delphacodes kuskelli)		500-750 cm3
Sorgo	Pulgón (Rhopalosiphum maidis)		750 cm3
Papa	Pulgón verde (Myzus persicae), Pulgón de la papa (Macrosiphum euphorbiae)		25 cm3
Trigo	Gorgojo del trigo (Listronotus bonariensis), Pulgón verde de los cereales (Schizaphis graminum)		60 -100 cm3
Poroto	Mosca blanca (Hemisia tabaci)	-----	70 -100 cm3
Lechuga	Mosca blanca (Hemisia tabaci, Trialeurodes spp.) Pulgón de la lechuga (Hyperomyzus lactucae) Trips (Frankliniella spp.)	-----	50 cm3 (Diluir esta dosis en 25-50 cm3 de agua)
Avena (Tipo suregrain)	Pulgón verde de los cereales (Schizaphis graminum)	Insectos de Suelo: Gusanos blancos (Diloboderus abderus; Cyclocephala spp.) Gusanos alambre (Discyretus gagotes, Conoderus spp. Agriotes spp.)	175 cm3
Algodón	Pulgón del algodón (Aphis gossypii) Trips (Frankliniella paucispinosa) Tenebriónido de girasol (Blapstinus spp.)		470 cm3 Caldo: volumen superior a 1500 cm3

RESTRICCIONES DE USO: "En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia."

La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley Nº 18.073 que prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con terapicos para tratamientos de semillas con granos destinados al consumo humano o animal.

COMPATIBILIDAD: Si bien no presenta incompatibilidad manifiesta con otros productos fitosanitarios y/o fertilizantes, por sus características se recomienda aplicarlo solo. No aplicar junto ni en aplicaciones consecutivas separadas con productos de reacción alcalina o fuertemente oxidantes.

FITOTOXICIDAD: PHILIMIDA 60 no es fitotóxico siguiendo las indicaciones del rótulo.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

IMPORTANTE: PHILAGRO S.A. ofrece este producto cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición, concordante con la declarada. Cómo la aplicación se hace sin el control de **PHILAGRO S.A.**, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variables. **PHILAGRO S.A.** no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al empleo de este producto y sobre todo si se hiciese en forma distinta a la indicada en el rótulo.



NOCIVO

